АКРОБАТ® МЦ

Профессионал в картофелеводстве!

- одновременное действие против основных заболеваний картофеля — фитофтороза и альтернариоза
- отличное профилактическое действие
- лечебное действие на ранних стадиях развития патогена
- антиспорообразующее действие

BASF
We create chemistry

Программа защиты картофеля



АКРОБАТ МЦ —
профессионал в картофелеводстве!

Двухкомпонентный фунгицид **АКРОБАТ МЦ** содержит два действующих вещества: **локально-системный** диметоморф и **контактный** манкоцеб.

АКРОБАТ МЦ действует против возбудителя фитофтороза на всех стадиях развития патогена: **профилактически** — предотвращает начало заболевания, **лечебно** — останавливает развитие заболевания на начальных стадиях (2–3 дня после заражения), а также **останавливает спороношение** предотвращая распространение заболевания.

Обработка фунгицидом **АКРОБАТ МЦ** обеспечивает **защиту растения изнутри** и позволяет профилактически защищать растение в период активного роста ботвы за счет локально-системного распределения диметоморфа (см. рис. 1). Благодаря этому свойству применение фунгицида **АКРОБАТ МЦ** позволяет эффективно защищать картофель от болезней на начальных этапах развития растения.

Во второй половине сезона необходимо планировать обработки с учетом эффективности против альтернариоза (Alternaria spp.). Применение препарата **АКРОБАТ МЦ** после смыкания ботвы в рядках обеспечивает **эффективность против** обоих заболеваний — **фитофтороза** и **альтернариоза**.

Препараты БАСФ для защиты картофеля от фитофтороза и альтернариоза

Препарат	ПОЛИРАМ ДФ	АКРОБАТ МЦ
Действующие вещества	Метирам (700 г/кг)	Диметоморф (90 г/кг) Манкоцеб (600 г/кг)
Спектр действия	*Phytophthora infestans* и *Alternaria solani* *Alternaria alternata*	*Phytophthora infestans* и *Alternaria solani* *Alternaria alternata*
Норма расхода (картофель)	1,5–2,5 кг/га	2,0 кг/га
Кратность обработок (картофель)	4	3



Рисунок 1. На трех рисунках представлены фотографии одного растения картофеля сделанные в разное время: в начале опыта в центре стебля на растение картофеля с помощью аппликатора нанесли диметоморф с помеченным радиоактивным изотопом (1-е фото сделано через 1,5 часа после нанесения диметоморфа, 2-е и 3-е через 36 часов и через 5 дней, соответственно). Цвет указывает на концентрацию препарата — красный соответствует максимальной концентрации, синий — минимальной.



Рисунок 2. Эффективность фунгицида АКРОБАТ МЦ против фитофтороза и альтернариоза

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Архангельск	(985) 230-24-59
Астрахань	(927) 256-50-24
Барнаул	(983) 181-95-90
Белгород	(915) 529-55-83
Биробиджан	(914) 556-31-91
Благовещенск	(914) 556-31-91
Брянск	(919) 046-93-89
Великий Новгород	(919) 046-93-89
Владивосток	(914) 075-30-09
Владимир	(985) 230-24-59
Волгоград	(927) 256-50-24
Вологда	(985) 230-24-59
Воронеж	(919) 180-25-28
	(910) 738-17-23
Екатеринбург	(982) 644-63-08
Иваново	(917) 502-65-16
Иркутск	(985) 230-24-59
Казань	(917) 260-02-22
	(917) 396-76-10
Калининград	(911) 461-45-17
Кемерово	(983) 181-95-90
Калуга	(919) 046-93-89
Кострома	(917) 502-65-16
Краснодар	(861) 202-22-99
Красноярск	(983) 181-95-90
Курган	(982) 938-82-81
Курск	(915) 519-58-68
Липецк	(915) 850-59-22
Москва	(985) 230-24-59
Нижний Новгород	(917) 502-65-16
Новосибирск	(983) 181-95-90
Омск	(913) 688-51-38
Орел	(915) 507-70-71
Оренбург	(922) 627-53-02
Пенза	(963) 100-00-65
	(963) 100-48-54
Псков	(919) 046-93-89
Ростов-на-Дону	(918) 507-73-72
Рязань	(910) 582-89-12
Самара	(987) 162-08-00
Санкт-Петербург	(985) 230-24-59
Саранск	(963) 100-00-65
	(963) 100-48-54
Саратов	(987) 834-34-00
	(927) 226-04-63
Смоленск	(919) 046-93-89
Ставрополь	(962) 449-57-30
Тамбов	(910) 759-24-75
Тверь	(919) 046-93-89
Томск	(983) 181-95-90
Тула	(910) 582-89-12
Тюмень	(982) 938-82-81
Ульяновск	(917) 396-76-10
	(963) 100-48-54
Уфа	(917) 404-15-70
Хабаровск	(914) 556-31-91
Челябинск	(982) 644-63-08
Ярославль	(985) 230-24-59

BASF
We create chemistry

agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru